


# 12월 식중독 주의 정보 알림

## 노로바이러스로 인한 식중독 발생 위험이 높음

### 발생지역 현황




❖ 경기(39건), 서울(27건), 대구(12건) 등에서 발생하였음. \* 경기(수원 9건), 서울(강남·마포 각 5건), 대구(수성 5건)

### 원인균 현황



❖ 노로바이러스(56건)으로 인한 발생이 많았음.

### 발생시설 현황



❖ 음식점(96건), 기타(17건), 학교외집단급식(16건) 등에서 발생하였음.  
\* 음식점(회집·일식 43건), 기타(수산물도소매·직판장 3건) 등



### 노로바이러스는 손씻기 생활화로 예방

노로바이러스 감염증은 노로바이러스에 오염된 음식물과 물을 섭취하였거나, 환자 접촉을 통한 사람 간 전파가 가능합니다. 그렇기 때문에 면역력이 약한 어린이나 노인인 단체생활을 하는 학교 등에서는 손씻기를 통해 노로바이러스를 예방해야 합니다.

#### 실천한 당신



#### 반드시 손씻기를 해야하는 경우



음식 조리 전



수유 하기 전



배변 전·후



기저귀 교체 전·후



설사 또는 구토 증상이 있는 사람과 접촉할 경우



외출 후

#### 안씻으면



\* 겨울철 식중독 주의정보는 노로바이러스 예방 시리즈(노로바이러스 예방수칙(11월) → 손씻기 생활화(12월) → 올바른 손씻기 → 구토물처리방법 → 식품섭취시 주의사항)로 매월 송부합니다.